


Hépatite A



Fait

Le rétablissement peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui entraîne de l'absentéisme au travail, à l'école et dans la vie de tous les jours²⁴

*Le risque d'infection est déterminé d'après le taux estimatif de prévalence, dans la population, des anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite A (anti-VHA), qui est le marqueur d'une infection à VHA antérieure. Ce marqueur repose sur des données limitées et peut ne pas rendre compte de la prévalence actuelle²³



Voie oro-fécale

Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, contacts sexuels ou personnels étroits avec une personne infectée, consommation de drogue intraveineuse²⁴



126 millions de cas

par an à l'échelle mondiale (estimation de 2005)²⁵



Symptômes: Fièvre, malaise, perte d'appétit, diarrhée, nausées, gêne abdominale, urine de couleur foncée et ictère²⁴

Cas grave: Rarement, insuffisance rénale aiguë pouvant entraîner le décès²⁴



- Les précautions à prendre contre l'hépatite A, incluant les bonnes pratiques d'hygiène, choisir avec prudence les aliments et l'eau consommée ainsi que la vaccination, devraient être considérés :

- Adopter une bonne hygiène personnelle, telle que se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre après être allé à la toilette et avant de préparer des aliments²⁴
- Éviter de consommer des aliments qui peuvent avoir été préparés par une personne infectée qui ne s'est pas bien lavé les mains et des boissons contenant de l'eau ou des glaçons contaminés²⁵
- S'abstenir de manger des crustacés crus ou insuffisamment cuits²⁵