


# Diphtérie\*



## Fait

On estime que de 5 à 10 % des personnes qui contractent l'infection mourront des complications<sup>19</sup>

\*Maladie principalement respiratoire. La forme cutanée de la maladie est aussi fréquente en zone de climat tropical<sup>20</sup>



### Voie respiratoire

Transmission d'une personne à une autre par contact étroit avec une personne infectée par *C. diphtheria* ou avec ses possessions<sup>19,20</sup>



### 4 778 cas

par an à l'échelle mondiale (estimation)<sup>18</sup>



**Symptômes:** Faible fièvre (rarement > 38,3 °C), mal de gorge, difficulté à avaler, malaise, perte d'appétit et, si le larynx est touché, enrouement<sup>20</sup>

**Cas grave:** Formation de pseudomembranes dans la gorge, les amygdales et le larynx pouvant causer une obstruction mortelle des voies respiratoires et de la difficulté à respirer<sup>20</sup>



- Les précautions à prendre contre la diphtérie, incluant les bonnes pratiques d'hygiène ainsi que la vaccination, devraient être considérés:
  - S'assurer de tenir la vaccination contre la diphtérie à jour et obtenir un vaccin de rappel en prévision d'un voyage vers des zones endémiques<sup>19,20</sup>
  - Se laver les mains à fond et régulièrement<sup>21</sup>
  - Éviter autant que possible d'entrer en contact avec une personne qui présente des symptômes de maladie respiratoire<sup>21</sup>
  - S'abstenir de partager des articles personnels, tels que des ustensiles, des verres à boire, de la vaisselle, des brosses à dents et des serviettes<sup>22</sup>