


Hépatite B



Fait

Chaque année, plus de 686 000 personnes meurent des complications de l'hépatite B, y compris la cirrhose et le cancer du foie²⁸

*Le risque d'infection est déterminé d'après le taux estimatif de prévalence, dans la population, de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B (AgHBs), qui est le marqueur d'une infection à VHB chronique. Ce marqueur repose sur des données limitées et peut ne pas rendre compte de la prévalence actuelle²⁷.



Contact percutané, muqueux et sexuel

Transmission d'une personne à une autre par contact étroit avec une personne infectée par un virus de l'hépatite B ou avec ses possessions, et par l'injection de drogue intraveineuse²⁸



240 millions de personnes

atteintes d'une infection chronique à l'échelle mondiale (estimation)²⁸



Symptômes: Ictère, urine de couleur foncée, fatigue extrême, nausées, vomissements et douleur abdominale²⁸

Cas grave: Insuffisance rénale aiguë (pouvant entraîner le décès), cirrhose et cancer du foie²⁸



- Les précautions contre l'hépatite B, incluant les bonnes pratiques d'hygiène, les pratiques sexuelles sûres ainsi que la vaccination, devraient être considérés^{28,29}:
 - Employer une technique d'injection sûre et éviter tout contact avec des aiguilles qui présentent un risque de contamination, comme dans le cas de tatouage ou de perçage^{28,30}
 - Adopter des pratiques sexuelles sûres (telles qu'utiliser des condoms et limiter le nombre de partenaires au minimum)²⁸
 - S'abstenir de partager des articles personnels qui pourraient être souillés par du sang contaminé, tels qu'une brosse à dents ou un rasoir³⁰