

# Fièvre typhoïde



## Fait

La fièvre typhoïde est causée par la bactérie *Salmonella enterica* sérotype *Typhi* (*S. typhi*), qui ne vit que chez l'humain<sup>79,80</sup>



### Voie oro-fécale

Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des matières fécales provenant d'une personne infectée ou d'un porteur chronique<sup>79</sup>



### 21 millions de cas

par an à l'échelle mondiale (estimation)<sup>79</sup>

Plusieurs études ont révélé que les enfants qui voyagent, les longs parcours, l'achlorhydrie ou tout traitement de réduction de l'acidité gastrique, et les voyageurs qui rendent visite à des amis ou à de la famille sont tous des facteurs qui augmentent les risques de typhoïde du voyageur<sup>81</sup>



**Symptômes:** Fièvre, fatigue, céphalées, douleur abdominale, constipation ou diarrhée (selon l'âge)<sup>79</sup>

**Cas grave:** Dysfonctionnement cérébral, délirium, perforation intestinale, décès<sup>79</sup>

Le taux de mortalité est approximativement de 10 % chez les patients non traités dans les pays à faible revenu, et il est inférieur à 1 % chez les patients qui reçoivent des soins dans les pays à revenu élevé<sup>81</sup>



- Des précautions contre la fièvre typhoïde, incluant les bonnes pratiques d'hygiène, le lavage fréquent des mains, choisir avec prudence les aliments et l'eau consommée ainsi que la vaccination, devraient être considérés<sup>79</sup>:

- Consommer des aliments bien cuits et encore chauds<sup>82</sup>
- Ne pas manger de viande ni de fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, de salades et de fruits ou légumes crus qui ne peuvent être pelés<sup>82</sup>
- Éviter de boire de l'eau du robinet (y compris les boissons aux fruits) et des boissons contenant des glaçons<sup>82</sup>
- Se laver fréquemment les mains<sup>82</sup>